

敏惠醫護管理專科學校

實習場所 相關資料簡介



實習醫院：臺北市立聯合醫院中興院區

實習單位：9A 病房

臨床教師：蔡瑜君護理長

實習指導教師：白香菊老師



目 錄

壹：實習場所

- 一、 實習單位簡介-----○
- 二、 常見疾病診斷-----○
- 三、 常用藥物-----○
- 四、 常見護理技術-----○
- 五、 常見檢查-----○
- 六、 病房常規-----○
- 七、 實習注意事項-----○

貳：住宿場所

- 一、 住宿地點介紹-----○
- 二、 住宿注意事項-----○

壹、實習場所

一、實習單位簡介

1. 病房特性：胸腔內科
2. 總床數：40 床
3. 醫院電話：(02) 2552-3234
4. 病房護理長：蔡瑜君護理長 手機：0979305823
5. 單位護理人員總人數：10 人
6. 上班人數：白班：4 人、小夜：2 人、大夜：2 人

二、常見疾病診斷

縮寫	英文全文	中文
	Aspiration Pneumonia	吸入性肺炎
	Asthma	氣喘
ARF	Acute Respiratory Failure	急性呼吸衰竭
	Arrhythmia	心律不整
	Alveolar Cell Carcinoma	肺泡癌
	Pulmonary Edema	肺水腫
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群
BHP	Benign Prostatic Hyperplasia	良性前列腺肥大
	Bradycardi	心搏過緩
	Tachycardia	心搏過速
	Bronchitis	支氣管炎
	Bronchopneumonia	支氣管肺炎
	Bronchial Asthma	支氣管氣喘
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	慢性阻塞性肺疾病
CVA	Cerebro-Vascular Accident	中風
CHF	Congestive Heart Failure	充血性心衰竭
CAD	Coronary Artery Disease	冠狀動脈疾病
DM	Diabetes Mellitus	糖尿病
DU	Duodenal Ulcer	十二指腸潰瘍
DKA	Diabetic Ketoacidosis	糖尿病酮酸中毒
DI	Diabetes Insipidus	尿崩症
	Emphysema	肺氣腫

FUO	Fever of Unknown Origin	不明熱
GU	Gastric Ulcer	胃潰瘍
	Gall Bladder Stone	膽結石
	Hemothorax	血胸
	Hypertensive Cardiovascular Disease	高血壓性心臟血管疾病
	Hypertension	高血壓
	Hypotension	低血壓
	Hepatoma	肝癌
HCC	Hepatocellular Carcinoma	肝細胞癌
	Ileus	腸阻塞
	Idiopathic Retroperitoneal Fibrosis	自發性後腹腔纖維化
LC	Liver Cirrhosis	肝硬化
	Lung Cancer	肺癌
MI	Myocardia Infarction	心肌梗塞
	Nephrotic Syndrome	腎病徵候群
	Pancreatitis	胰臟炎
PU	Peptic Ulcer	消化性潰瘍
PE	Pleural Effusion	肋膜積水
	Pneumoconiosis	肺塵症
	Pneumonia	肺炎
	Pneumothrax	氣胸
	Sepsis	敗血症
	Septic Shock	敗血性休克
SOB	Short Of Breath	呼吸短促
SCC	Squamous Cell Carcinoma	鱗狀細胞癌
TB	Tuberculosis	結核
UTI	Urinary Tract Infection	泌尿道感染
ESRD	End Stage Renal Disease	末期腎疾病
	Uremia	尿毒症
UGI bleeding	Upper Gastrointestinal Bleeding	上腸胃道出血
EVB	Esophageal VaricoseBleeding	食道靜脈曲張出血
	Busulfan Lung	間質性肺炎
RML	Right Middle Lobe	右中肺葉
LLL	Left Lower Lobe	左下肺葉
AE	Acute Exacerbation	急性惡化

三、常用藥物

藥 名	作 用	副 作 用	其 他
Absint	鎮靜安眠	BP↓尿滯留妄想注射太快呼吸停止	禁：飲酒重症肌無力
Actrapid HM	降血糖〈胰島素〉	血糖過低	
Adalat 〈5or10mg/cap〉	降血壓〈鈣離子阻斷劑〉	BP↓，心悸	20or30mg/tab
Adalat-retard	降血壓〈鈣離子阻斷劑〉	BP↓，心悸	
Afuco	抗炎鎮咳鬆弛支氣管平滑肌	胃不適 失眠	
Akineton 2mg	抗巴金森症	IV→BP↓	對運動不能和僵直最有效
Albumin	↑血管中滲透壓	BP↓過敏 HR↑ 注射太快→過度負荷及肺水	
Aldactone	利尿劑	留鉀排鈉	低鉀飲食
Aldoment	刺激α接受體↓Renin 活性		
Aleviatin 100mg/tab 〈Dilantin〉	抗癲癇	血糖↓ 運動不能	禁牛奶鎂鋁 劑藥物同服
Alinamin-F	Vitamin B12〈補血助神經修復		
Allergen	抗組織胺 抗過敏	BP↓，心悸	
Allopurinol 100mg/tab	↓尿酸生成 抗痛風	腹瀉 過敏	
Alon	解熱鎮痛劑 抗凝血		
Alonix-s 〈Adalat	降血壓〈鈣離子阻斷劑〉	BP↓，心悸	
Alupent	支氣管擴張劑〈Beta 腎上腺素受體活化〉	心悸	禁：心律不整嚴重H/T 病狀動脈疾病者用
Amaryl	降血糖〈利用基因工程↑胰島素分泌↑周邊組織對胰島素敏感度〉	血糖↓腸胃不適	長期服用血 糖不易起伏
Amikin	胺基配醣體抗生素〈抑蛋白質合成〉	聽、腎毒性	
Amikacin	胺基配醣體類抗生素	聽、腎毒性	
Aminophlline 100mg/tab 〈Xanthine〉	支氣管擴張劑 微利尿〈抑phosphodiesterase 活性防Cyclic AMP 被破壞分解〉	下痢心悸 BP↓腎毒性 CNS 興奮 HR↑	
Amiyu	胺基酸補充劑		IV：200ml 滴 1~1.5 小時
Ampicilline	青黴素類抗生素〈破壞細胞壁	過敏 腸胃不適	
Amoxicillin	青黴素類抗生素〈破壞細胞壁	過敏 腸胃不適	

〈Amocillin〉			
Apresoline 100mg/tab	降血壓〈鬆弛血管平滑肌〉	HR ↑ 頭痛臉紅	
Artane	抗膽鹼激性平滑肌鬆弛劑抗巴金森症		對僵直最有效
Asamox	消化劑〈↑腸神經叢之 ACH 分泌〉	腸絞痛	
Ascotyl	解熱鎮痛劑 抗凝血		G6PD 禁用
Askacef	頭孢子類抗生素〈破壞細胞壁〉	腎臟、肝臟毒性	
Aspirin	解熱鎮痛劑 抗凝血	BP 微下降	
Astomin	抗組織胺阻斷劑治過敏及鼻炎	BP ↓，心悸過量→死亡	12 週才能完全排出體外
Asverin	鎮咳去痰劑	失眠食欲不振過敏	
Ativen 0.5mg/tab	抗焦慮 安眠	嗜睡不安	12 歲 ↓ 不用
Atrovent	支氣管擴張劑〈副交感神經抑制〉	心悸頭痛腹不適	蒸汽吸入劑
Augmentin 375mg/tab	青黴素類抗生素〈破壞細胞壁〉	過敏 腹瀉 肝毒性	
Aurorix 150mg/tab	抗憂鬱		不影響 pt 的警覺性及反應力
Bafen	骨骼肌鬆弛劑	腎毒性 幻覺 想睡	
Baktar	磺胺類抗生素〈破壞細胞壁〉	過敏口舌炎貧血	
Baccidal	抗生素〈抑細菌 DNA 複製〉	腎功能不佳者需注意	
Berotec	支氣管擴張劑〈1. Beta-2 擬交感神經 ↑ 2. ↑ 形成 cAMP 3. ↑ 黏膜纖毛廓清作用〉	手指震顫心悸頭痛	
Betal oc	降血壓〈Beta 受體拮抗劑〉	HR ↓ 心悸呼吸急促	
Bisolvon	化痰劑	初期咳嗽加劇	
Bensau	鎮咳劑		
Bokey	1 解熱鎮痛劑〈阻斷前列腺素合成〉 2. 抗凝血〈↓血小板凝集〉	Bp 微下降	
Buscopan	止吐止瀉 ↓ 腹痛〈抗膽鹼激素 ↓ 腸胃活動〉	對眼睛唾腺或心臟副作用	
Calmday	抗焦慮〈BDZ 類鎮定劑〉		
Capoten Captrol Captopri Captopril	降血壓〈血管加壓素轉化酶抑制劑〉	乾咳口乾	
Castor oil	瀉劑〈蓖麻油〉	嘔吐下痢	
Cedocard 〈同 Isordil〉	降血壓		
Cefadol	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Ceretal Cental	腦代謝改善劑〈抑血小板凝集〉	胃不適胸悶	

Trental			
Cekodin Cefadin Cefamezin Cefazolin Cefadnoxil	頭孢子類抗生素〈破壞細胞壁〉	腎臟、肝臟毒性	適用於葡萄球菌，肺炎 球菌，腦膜炎菌
Cephadol	止暈止吐〈↓前庭興奮 抑 CNS 活性〉	思睡消化不良口乾	
Chisou	去痰劑		
Cipram	抗憂鬱劑〈抑 Serotonin 吸收〉	出汗唾液↑	
Circulon	促腦循環劑〈抗血小板凝集 ↑末梢血流量〉銀杏葉萃取物		
Clexane	抗血栓〈抑血小板凝集〉	肝毒性 出血	皮下注射
Colistrin	抗生素〈破壞細胞膜〉	呼吸停止 SOB	
Colchicine	抗痛風發炎〈↓WBC 慘產生尿酸〉	噁心嘔吐腹瀉腹痛	
Coracten〈同 Adalat〉	抗狹心症	腸胃不適 BP 下降	
Coroherser	同 Herbesser		
Corosan-75	預防血栓〈抗血小板凝集〉		
Costi	消化利膽劑 加速胃排空		
Coumadin	抗凝血劑	出血肝炎皮膚炎	維他命E及K不能大量 取
Curam	青黴素類抗生素	過敏 腸胃不適	
Dail	降血糖〈↑胰島素分泌〉	皮膚騷癢紅斑腸胃不適	
Danzen	化痰 消腫 纖維塊溶解		
Daonil〈同 Euglucon〉	降血糖		
Deanxit	抗精神病↓妄想幻覺 思緒不寧		無鎮靜安眠
Depermid	降血壓利尿〈1. 抑 PGI-2→擴張 血管 2. 抗凝集或 3. 鈣離子阻 斷〉		
Dextrose	人工糖		
Diaformin	降血糖〈↓腸道吸收↓肝醣分解 ↑細胞利用〉		
Diflucan	抗生素〈抗黴菌〉		
Digel	制酸抗發脹		咀嚼更佳
Digoxin	強心配醣體〈1. 抑 ATPase→抑 鉀幫浦〉2. 促鈣入心肌細胞→ 心肌收縮↑心輸出量〉	GI 及 CNS 毒性 心律不整 HR↓	利尿 HR<60 停藥
Dilantin	抗癲癇	血糖↓ 運動不能	禁牛奶鎂鋁劑藥物同服

Dilatrend	降血壓〈1. Beta-Blocker → r 血管擴張 2. 抗氧化 3. ↑ 血脂代謝 → ↑ HDL-C ↓ LDL-C ↓ TG〉	姿位性低血壓	
Diltelan 〈同 Herbesser〉 Diltisser Dilzem	降血壓		
Diovan	降血壓〈血管收縮素-2 之受體 AT1 拮抗劑〉	URI	
DMP	消化劑〈促胃排空〉		
Dogmatyl	鎮靜安眠		
Doxaben	降血壓 α-1 腎上腺素受體阻斷劑		
Dulcolax	輕瀉劑		
Duphalac	輕瀉劑		
Duracef	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Erispan	鎮靜安眠	步行失調頭重腳輕	
Essentiale	維生素 B 群		
Ethytase	消化劑和胰臟性消化劑		
Eubrain	促腦代謝循環劑〈通過 BBB ↑ 腦血流 ↑ 腦傳導功能〉		
Euclidan	末梢血管擴張劑	倦怠頭痛眩暈臉潮紅	
Euglucon	磺基尿素類降血糖藥 〈↑ 胰島素分泌〉		
Eurodin	鎮靜安眠	步行失調頭重腳輕	
Felop	降血壓 血管擴張		
Flexin	骨骼肌鬆弛劑		
Flucil	化痰劑		
Fluimucil	化痰劑		
Fluitran	利尿劑降血壓〈排鈉鉀氯離子〉	鈣離子 ↑ 血糖 ↑	
Fortum	頭孢子類抗生素	肝 腎 血液 毒性	
Garamycin	胺基配醣體類抗生素	聽、腎毒性	
Gascon	消脹氣		
Gasgel	制酸劑		
Gelusil	制酸劑		
Gaster	促胃潰瘍癒合劑〈組織胺 H2 接受體拮抗劑 → ↓ 胃酸分泌〉	肝毒性便秘下痢口渴噁心嘔吐	
Genrin	抗生素		泌尿道感染用
Gentamycin	胺基配醣體類抗生素	聽、腎毒性	
Genopril	降血壓		

Glidiab	降血糖〈↑胰島素分泌之磺基		
Glutrol	素類藥物〉		
Glucophage	降血糖〈↓腸道吸收↓肝醣分解 ↑細胞利用〉		
Halcin	安眠劑		
Haldol 0.5mg/tab	抗焦慮 安眠	EPS 症狀 憂鬱	
Helpa	抗腫瘤藥物〈5-UF 衍生物〉		
Heparin	抗凝血劑	出血過敏腎臟毒性	注射部位刺激
Herbesser	降血壓〈鈣離子阻斷→血管擴張→↑心血流↓BP〉	HR↓肝毒性過敏	肺瘀血孕婦 2 或 3 度 AV 傳導阻斷 AMI 病患禁用
Hytrin	@交感神經阻斷劑→↓BP ↓血脂 BPH 改善		睡前使用
Imodium 2mg/cap	止瀉劑	便秘嘔吐	
Imovane	鎮靜安眠		
Inderal 10 或 40mg/tab	腎上腺阻斷劑 擴張血管	HR BP 下降	
Ipradol	B2 受體興奮劑→支氣管擴張	震顫心悸出汗不安	
Is-5 mono 20or40mg/tab	冠狀血管擴張劑，降血壓	姿位性低血壓 HR↑臉潮紅頭份 眩暈	
Ismo-20	冠狀血管擴張劑，降血壓	同上	
Isodil	冠狀血管擴張劑，降血壓	同上	
Isoptin 40 mg/tab 120mg/cap	降血壓 治 PSVT〈抑鈣入心〉		
Kalimate	降鉀離子〈以鈣在腸道交換〉	便秘	
KBT	止瀉劑		
KCL	補充鉀及氯離子	鉀過量心律不整	
Keflex	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Kentamin	輔 Vitamin B12→抗貧血		
Kerlone	降血壓〈Beta-腎上腺素阻斷劑 游離脂肪酸不干擾醣類代謝〉		勿與 MAO 抑制劑或 Verapamil 併用 HR<50 禁用
Ketoprofen 〈同 Aspirin〉	解熱鎮痛劑 抗凝血		
Lanitop 〈同 Digoxin〉	強心配醣體↑心輸出量心肌收 縮		
藥 名	作 用	副 作 用	其 他
asix	利尿劑排鈉鉀氯離子	電解質過低	姿位性低血壓
Lemobex	綜合維他命		
Lexotan	抗焦慮		

Levophed	血管收縮〈↑@腎上腺素受體〉 ↑心肌收縮〈↑Beta-腎上腺素	HR↓ 血糖↑ 外滲後組織壞死	
Lipitor	降高血酯	頭痛	
Lisacef 〈同 Askacef〉	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Licodin	抑血小板凝集抗血栓	肝毒性出血	
Lomidine	抗過敏消鼻炎〈組織胺 H1 受體拮抗〉		
Magacid	制酸劑 輕瀉	下痢過敏	
Mannitol	排水 ↓腦壓	口渴電解質不平恆	
Medicon 15mg/tab	鎮咳		
Medicon-A	鎮咳化痰		
Medopa	降血壓〈↑@血管受體→血管擴張 HR↓〉	肝毒性尿色變暗鎮靜水鈉滯留	
Mefoxin	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Melleril	抗憂鬱症短期用藥	肝毒性褐視夜視↓視力↓	視覺改變時應停藥或減藥
Meptin 25ug/tab	支氣管擴張劑		
Mesyrel	抗憂鬱症	思睡口乾	
Methylcoba	Vitamin B12		
Mevalotin	降高血酯	肝毒性 腹瀉	
Mexitil	抗心律不整	血壓降運動失調腸胃不適	
MgO 0.3mg/tab	制酸 輕瀉劑	鎂中毒	
Mitrolan 500mg/tab	止瀉劑		
Mixtard	降血糖〈胰島素〉	血糖過低	
Mobic	解熱鎮痛劑〈阻斷前列腺素合成〉	腸胃不適 紅白血球減少	
Monotard HM	降血糖〈基因組合製成胰島素	血糖過低	
Mucaine	制酸抗發脹		
Mucosolven	祛痰劑		
Muscalm-s	骨骼肌鬆弛劑		
Mykrox 0.5mg/tab	利尿劑 降血壓 排鈉氯鉀氫	腹瀉便秘黃膽	
Nacid	制酸劑 抗胃蛋白梅		
Naposin	阻斷前列腺素合成→解熱鎮痛		
Neomycin	胺基配醣體類抗生素	聽、腎毒性	
Nicarpine	降血壓〈抑鈣入血管平滑肌〉		
Niferex	抗缺鐵性貧血		
Nirena	降血壓〈鈣離子阻斷冠狀血管		

〈同 Adalat Coracten〉	擴張劑		
Nakamid	利尿降血壓〈1. ↑ PGE2 ↓ PGI2 →血管擴張 2 ↑ bradykinin 作用	鈉氯鉀氫排出過度	
Nirena 〈同 Adalat	降血壓		
Nootropil 〈同 Eubrain〉 Normabrain	促腦代謝循環劑		
Norcol	鎮咳化痰劑		
Norvasc	降血壓 鈣離子阻斷劑		
Novamin	止吐劑	BP 下降	
NTG 〈即 Nitroglycerin〉	血管擴張抗心絞痛	姿位性低血壓	
Oradexon	類固醇〈↓免疫力 抗過敏 消腫		
Oxacillin	青黴素類抗生素〉	過敏 腸胃不適	
Panaldine	抑凝血	肝毒性噁心下痢貧血	出血
Pentrexyl	青黴素類抗生素		
Persantin	降血壓〈血管擴張劑〉	眩暈頭痛腸胃不適	AMI 禁用
Pitressin	抗尿崩〈1. ↑ 腎小管透過率→ 再吸收 ↑ 2. ↑ 血管收縮〉	心絞痛 腸胃不適 支氣管收縮	
Phosunk	降磷酸鹽劑〈↑腎排泄〉		
Phyllocontin	支氣管擴張劑	心悸 頭痛	
Prednisolone	類固醇〈↓免疫力 抗過敏 消腫〉	感染；出血傾向； 水鈉滯留血壓高水腫；血糖高 骨折；庫欣氏症候群….	
Premarin	凝血劑		
Prepulsid	促腸胃運動	腸絞痛	
Primalan	抗阻纖胺		
Primperan	消化劑止吐	肌僵直震顫	癲癇病人禁用
Progor	同 Herbesser		長期使用血壓不易起伏
Proheparum	肝病治療劑		
Prostaphlin	青黴素類抗生素	過敏 腸胃不適	
Prozac	抗憂鬱		
Purfen	解熱鎮痛劑		
Ranidine 〈同	促胃潰瘍癒合劑〈抑胃酸分泌		

Zantac			
Recef-A	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Refexin	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Relac	抗焦慮	頭昏噁心	
Relifex	NSAIDS 解熱鎮痛抗炎劑抗凝血	腹瀉腹痛肝毒性消化性潰瘍	
Renitec	降血壓〈血管加壓素轉化酶抑制劑〉	呼吸短促利害	
Rentudil	抗炎劑促關節恢復活動	胃腸潰瘍視覺模糊	
Retarpen	青黴素類抗生素〈只能 IM〉	要打大塊肌深部	IM 不能柔
RIF〈即 Rifampicin〉	抗肺結核〈抑核酸合成〉		
Riopan	制酸劑抗發脹		
Rivotril	抗驚厥劑〈癲癇連續發作肌強直和運動不能〉	思睡行動障礙肝毒性	肝病狹角性青光眼禁用
Scamin	促腦循環改善腦代謝		
Sectral	Beta 腎上腺素受體阻斷劑 降血壓		
Seglor	治低血壓〈抗腎上腺素〉		適姿位性低血壓
Seremin	控制癲癇再發 抗焦慮劑		
Serenal	抗焦慮		
Shan Yen	長效形磺胺類抗生素	肝臟毒性過敏	
Shinzyme	支氣管擴張劑	心悸頭痛失眠	
Silimin	肝病治療劑〈穩定肝細胞膜↓ 肝膽酯質變化↑肝膽分泌↑毒素 排除		
Sintabex	鎮咳		
Sintec〈同 Renitec〉	降血壓		
Slow-K	鉀離子補充劑	鉀過高	
Smarten	降血壓〈長效血管轉化酶- 抑制劑〉對臥立姿均有效		
Solaxin	骨骼肌鬆弛劑	組織胺釋出皮膚紅	
Solu-medrol	類固醇〈↓免疫力 抗過敏消 腫〉	感染；出血傾向； 水鈉滯留血壓高水腫；血糖高 骨折；庫欣氏症候群	
Spagagel	解胃蠕縮及制酸		
Stacaine	制酸		
Strocain	制酸止痛		
Stilnox	安眠藥		禁 15 歲↓孕婦哺乳婦用
Sucral	形成保護膜保護胃壁		
Syscor	降血壓〈鈣離子阻斷劑〉	腸胃不適心悸頭痛	

Szulen	抗組織胺抗過敏消炎促上皮形成肉芽新生		
Tagament	H2 接受體阻斷劑 抑胃酸分泌		
Takepron	↓胃酸分泌治腸胃潰瘍		
Tarweing	抑腸胃過度活動↓多汗↓唾液		
Tegretol	抗驚厥〈另：抗膽鹼激性抗抑鬱及肌肉鬆弛〉		
Tenormin 50or100mg	降血壓〈Bata-1 受體拮抗劑〉	心跳↓心輸出量↓	
Theolan 〈同 Xanthium〉	支氣管擴張劑		
Tienam	泌尿道抗感染劑		
Tinten	解熱鎮痛		
Tofranal	抗憂鬱劑		
Topsin	胺基配醣體類抗生素	聽、腎毒性	藥膏
Trancolon	止瀉劑		
Trandate	降血壓〈阻斷α和 Bata 受體〉		
Transamin	止血劑	噁心 心悸	
Tridil 〈同 NTG〉	血管擴張抗心絞痛		
Trental	促腦循環劑〈抗血小板凝集 ↑末梢血流量〉		
Trilisate	解熱鎮痛〈長效 12 小時〉		
Tritace	降血壓〈血管加壓素轉化酶抑制劑〉		兒童孕婦哺乳者不宜
Trizymal 〈同 Trizyme〉	消化劑		
Ucefa	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Ucefaxim	頭孢子類抗生素	腎臟、肝臟毒性	
Unasyn	青黴素類抗生素		
Urinorm	抗痛風〈阻斷尿酸形成、再吸收 ↑排泄↑腸胃道清除尿酸〉	肝毒性噁心過敏	
Urecholine	促解尿劑	發汗氣喘下痢潮紅	巴金氏症病人禁
藥 名	作 用	副 作 用	其 他
Ustimon	冠狀血管擴張劑		
Ustomin〈同 Szulen	促進循環		
Valium	抗憂鬱劑鎮靜安眠藥		

Vancomycin	抗生素〈抑細胞壁及膜〉	寒顫發燒噁心	抗葡萄球菌
Vena	抗組織胺抗過敏		
Ventolin	支氣管擴張劑		
Verelan-SR	鈣離子阻斷劑↓心跳〈AV 竇不應期時間延長〉		
Voltaren	解熱鎮痛抗風濕		
Wellpin	制酸消脹		
Xanthium 〈Aminophlline〉	支氣管擴張劑 微利尿	下痢心悸 BP↓腎毒性 CNS 興奮	
Xanax	靜安眠藥		
Xylocain 2%	局部麻醉劑 抗心率不整		
Yourgen	制酸劑		
Zantac	促胃潰瘍癒合劑〈組織胺 H2 接受體阻斷劑 → 抑胃酸分泌〉		
Zeffix	抗 B 肝病毒劑	抑鬱疲勞嘔吐下痢 URI	
Zestril	降血壓〈抑中樞神經的血管收縮〉	頭痛思睡	
Zimaron	治痛風劑〈↓尿酸形成↓再吸收↑排泄↑腸胃排出〉	噁心肝毒性	
Zithromax	巨環類抗生素		
Zocor	降血脂		
Zlofto	抗憂鬱劑		
Zyloric 〈同 Allopurinol〉	↓尿酸生成 抗痛風		
Zyrtec	抗組織胺抗過敏		

四、常見護理技術

1. 抽痰	2. 胸腔物理治療	3. 胰島素皮下注射
4. 肌肉注射	5. 蒸氣吸入	6. 氣切護理
7. 單次導尿	8. 存留導尿	9. 傷口換藥
10. 鼻胃管灌食	11. 出入院護理	12. 氧療
13. 靜脈點滴加藥	14. 皮內注射(PCT)	15. 導尿管護理
16. 灌腸	17. ROM 運動	

五、常見檢查

縮 寫	英文全文	中文
	Abdominal Sona	腹部超音波
	CT Scan	電腦斷層
PES	Endoscopy (Gastro-endoscopy)	胃鏡
SSEP	Somato-Sensory Evoked Potential	體感覺誘發電位
MEP	Motor Evoked Potential	動作誘發電位
VEP	Visual Evoked Potential	視覺誘發電位
BAEP	Brain Stem Auditory Evoked Potential	腦幹聽覺誘發電位
NCV	Nerve Conduction Velocity Test	神經傳導速度檢查
EMG	Electromyography	肌電圖
EEG	Electroencephalography	腦波測量（腦波圖）
ECG	Electrocardiogram	心電圖
CT	Computerized Tomography	電腦斷層攝影術
	Colonoscop	大腸鏡
On CMR	Chest Medical Routine	胸腔內科常規
Angio	Angiography	血管攝影術
Myelo	Myelography	脊髓攝影術
	Carotid Doppler Sonography	頸動脈杜卜勒超音波
TCD	Transcranial Doppler Sonography	顱內杜卜勒超音波
2-D Echo	two dimensional echocardiography	雙面超音波心圖
MRI	Magnetic Resonance Imaging	核磁共振造影術
MRA	Magnetic Resonance Angiography	磁振腦血管造影術
	Lumbar Puncture	腰椎穿刺
	Bronchoscopy	支氣管鏡檢查
PFT	Pulmonary Function Test	肺功能檢查
KUB	Kidney Ureter Bladder	腎輸尿管膀胱X光檢查

六. 病房常規

1. 治療時間(量 V/S)

項目	時間
QD	0900
BID	0900、1500
TID	0900、1300、2100
QID	0600、0900、1300、2100
I/O	0700-1500、1500-2300、2300-0700

2. 給藥時間

項目	時間
QD	0900
BID	0900、1700
BID/AC	0630、1630
TID	0900、1300、1700
TID/AC	0700、1100、1600
QID	0900、1300、1700、2100
Q6H	0600、1200、1800、2400
Q8H	0100、0900、1700
Q12H	0900、2100

3. 導管更換時間：

項目	時間
一般導尿管	兩週
矽膠導尿管	一個月
一般鼻胃管	兩週
矽膠鼻胃管	一個月

七. 實習注意事項：

貳、實習住宿場所

一. 住宿地點介紹

1、床數：4 床，4 人/間

2、設備：書桌、空調、衣櫃、床鋪

二. 住宿注意事項

1. 宿舍門禁時間為晚上 10 點鐘。
2. 同學夜間外出時，須結伴同行，並會知臨床教師，不可單獨行動。
3. 宿舍寢室內，嚴禁使用電器烹煮食物。
4. 宿舍區皆備有洗衣間、脫水機與晒衣場，請同學小心使用、愛惜公物，若有損壞者，需照價賠償。
5. 每日寢室需倒垃圾，每周進行清掃寢室，請各寢室室長負責督促。
6. 宿舍區備有垃圾桶，同學請依規定進行垃圾分類。
7. 清洗後的衣褲，嚴禁晾曬在寢室房內或是衛浴間。
8. 離開寢室時，請確實關好門窗、關閉電燈與電源。
9. 同學在宿舍區需降低音量，不可嬉鬧或大聲交談，以免影響其他人員休息。
10. 生理期的用品，切勿丟棄在馬桶內，請確實捲好並用垃圾袋包裹後，再行丟棄。
11. 實習結束，寢室內請確實打乾淨，恢復原狀，並委請臨床教師檢查後，方可離去。