

敏惠醫護管理專科學校

實習場所 相關資料簡介



實習醫院：台南安南醫院

實習單位：B61

實習指導教師：王靖潔



目 錄

壹：實習場所

一、實習單位簡介

-----○

二、常見疾病診斷

-----○

三、常用藥物

-----○

四、常見護理技術

-----○

五、常見檢查

-----○

六、病房常規

-----○

七、實習注意事項

-----○

貳：住宿場所

一、 住宿地點介紹

-----○

二、 住宿注意事項

-----○

壹、實習場所

一、實習單位簡介

1. 病房特性：胸腔內科
2. 總床數：50
3. 病房電話：05-5323911-2690. 2691
4. 病房護理長：林芯羽
5. 單位護理人員總人數： 人

上班人數：白班：5 人、小夜 3 人、大夜：2 人

6. 實習指導教師：王靖潔

TEL：0910871869

E-mail：julie720118@yahoo.com.tw

二、常見疾病診斷

縮寫	全文	中文
PN	Pneumonia	肺炎
	Pulmonary tuberculosis(TB)	肺結核
	Respiratory failure	呼吸衰竭
	Spontaneous pneumothorax	自發性氣胸
	Aspiration Pneumonia	吸入性肺炎
	Pneumoconiosis	肺塵症
	Lung abscess	肺膿瘍
	Hemothorax	血胸
	Pneumothorax	氣胸
	Empyema	膿胸
	Emphysema	肺氣腫
Acute(chronic)	Adult Respiration Distress Syndrome	成人呼吸窘迫症候群
ARDS ARF(CRF)	Respiratory Failure	急性(慢性)呼吸衰竭
	Pleural effusion	肋膜積水
	Pulmonary Edema	肺水腫

	Pulmonary embolism	肺栓塞
	Bronchiectasis	支氣管擴張
	Pericardiac effusion	心包膜積水
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	慢性阻塞性肺疾病
SOB	Short of Breath	呼吸短促
TB	Pulmonary tuberculosis	肺結核
	Lung cancer	肺癌
	Asthma	氣喘
	Bronchitis	支氣管炎
	Atelectasis	肺擴張不全
	Hemoptysis	咳血
	Bronchoscopy	支氣管鏡檢查
	Chest X-ray	胸部 X 光檢查
	Malignant neoplasm of thymus	胸腺惡性腫瘤
	Malignant neoplasm of bronchus and lung	支氣管及肺惡性腫瘤
	Malignant neoplasm of bronchus and lung	支氣管及肺惡性腫瘤
	Malignant neoplasm of trachea	氣管惡性腫瘤

☆胸腔呼吸系統部份：

11. Dyspnea-呼吸困難
12. Pulmonary Emphysema-肺氣腫
13. Hemoptysis-咳血
14. Hemothorax-血胸
15. Pulmonary embolism-肺栓塞
16. Pneumothorax-氣胸
17. Aspiration Pneumonia-吸入性肺炎
18. Cyanosis-發紺
19. Chest pain-胸痛
20. Cough-咳嗽
21. Apnea-窒息
22. Bradypnea-呼吸過緩
23. Dyspnea-呼吸困難
24. Tachypnea-呼吸過速
25. Cheyne-stokes breathing-陳施氏呼吸
26. Orthopnea-端坐呼吸
27. Inspiration/Expiration(I/E)-吸氣/呼氣

28. Sputum-痰液
29. Stridor-喘鳴
30. Wheezing-喘息
31. Lung Abscess-肺膿瘍
32. Atelectasis-肺擴張不全
33. PND(Paroxysmal nocturnal dyspnea)-陣發性夜間呼吸困難
34. Bronchiectasis-支氣管擴張症
35. Pleural effusion-肋膜積水
36. st tub intubation 胸管插管
37. ge or partial resection of lung 肺楔狀或部分切除術
38. cheostomy 氣管切開造口術

管路更換時間：

項目	時間
導尿管	不定期更換(原則應盡早拔除)
導尿管(矽質)	30 日更換一次
尿袋	不定期更換(原則應盡早拔除)
鼻胃管	7 日更換一次 鼻胃管
鼻胃管(矽質)	30 日更換一次
靜脈留置針	3 日更換一次
靜脈點滴注射管路	3 日更換一次

項目	時間
鼻胃管護理	9AM
留置尿管護理	9AM
CVP 照護	9AM
輸出入量紀錄	3PM
翻身	Q2h

Vital Sign 測量原則：

1. 新病人住院第 1、2 天每日 4 次(6Am-9Am-2Pm-9Pm)
2. 第三天起每天三次(9Am-3Pm-9Pm)
3. 若病情有變化(Fever、vital sign 不穩)每四小時加強監測，並依醫囑執行。

UD 常規治療時間

	口服藥	注射與其他治療	飯前治療
Qd	9Am	9Am	7Am
Bid	9Am-5Pm	9Am-5Pm	7Am-4Pm
Tid	9Am-1Pm-5Pm	9Am-1Pm-5Pm	7Am-11Am-4Pm
Qid	9Am-1Pm-5Pm-9Pm	9Am-1Pm-5Pm-9Pm	7Am-11Am-4Pm-9Pm
HS	9Pm	9Pm	9Pm
Q6H	11Am-5Am-11Pm-5Pm	--	--
Q8H	9Am-5Pm-1Am	--	--

白班工作流程時間表

0750-0800	工作前準備
0800-0815	病房日誌交班(需清楚病床總數、檢查或開刀人數、項目、病危人數及床號、特殊交班內容)每天會抽問
0830-0900	交班及晨間護理(應了解當日個案照護重點)
0900-1000	測量生命徵象及給藥(應於給藥時間點前後30 分鐘內完成) 勿延遲或忘記給藥，若違反則依校規處分
1000-1100	協助傷口換藥及接新病人(負責量BH、BW、生命徵象及環境介紹)
1100-1200	給藥(飯前) 勿延遲或忘記給藥，若違反則依校規處分(若為胰島素用藥，需確認是否需測量BS 或應知道早上BS 數值)、
1130	第一梯次同學用餐
1200-1230	第二梯次同學用餐
1300-1400	測量生命徵象、給藥(飯後) 勿延遲或忘記給藥，若違反則依校規處分
1400-1500 開會	(如：考試、回覆示教、上課)
1500-1600	完成紀錄書寫(以DART 方式進行)、one touch、記錄輸出入量

常見的護理技術

成人意識評估(GCS)	灌腸	血糖測試
給藥法	皮下注射	血氧測試
鼻胃管護理及灌食法	皮內注射	生命徵象測量
傷口換藥	導尿技術	肌力評估
更換靜脈輸液導管	冷熱敷使用	輔具使用

疼痛評估	肌肉注射	氧療法
------	------	-----

常用藥物

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
Acetylcysteine	Flutafin 200 mg / Cap	痰液溶解劑；促進顯影劑排除	噁心、嘔吐、口炎、過敏反應、支氣管痙攣
Atropine Sulfate	Atropine 1 mg / ml / Amp	抗膽鹼激性藥物	口乾燥、視力模糊、尿液滯留、便秘、心悸、心跳過速
Acetaminophen	Tinten 500 mg / Tab	解熱鎮痛	發紺、溶血性貧血、黃疸
Aspirin	Bokey 100 mg / Cap	減少血小板的凝集	胃不適、心灼感、噁心、流血時間延長
Allopurinol	Zyloric 100 mg/Tab	降低血中及尿中尿酸濃度	皮膚出疹、發熱、噁心、肌肉酸痛、禿頭、皮膚炎、嘔吐
Amlodipine Besylate	Norvasc 5 mg / Tab	降血壓	頭痛、暈眩、乾咳、低血壓、倦怠
Albumin	Human Albumin 20% 50 ml / BT	增加血中滲透壓，進而牽引液體進入血流，增加血容積	低血壓、過敏反應、頭痛、噁心嘔吐。滴注太快會引起血液過度負荷及肺水腫
Ambroxol HCl	Mucosolvan 30 mg / Tab	促進排除呼吸道內分泌物	疲勞、口乾、便秘
Amphotericin B	Fungizone 50 mg / Vial	抗黴菌抗生素	發燒、寒顫、腎功能損傷、噁心嘔吐、肌肉和關節痛
Acyclovir	Zovirax Cream 5% 2 g / Tube Zovirax 200 mg / Tab Zovirax 250 mg / Vial	抗病毒抗生素，抑制第一及第二型 Herpes simplex 病毒的活性。	皮膚疹、噁心、嘔吐、腹瀉與腹部疼痛、輕度及暫時性的 bilirubin 及肝酵素值升高、血氮及肌酸酐略增
Benzonatate	Benzonatate	Bensau 100 mg / Cap	解除咳嗽症狀
Bromhexine HCl	Bisolvon Solution 50 ml / BT	分解黏液，降低支氣管分泌物黏稠度，間接解除咳嗽	使用初期、痰液增加、咳嗽會加劇
Butylscopolamine (Scopolamine)	Buspan 10mg / Tab Lihosin 20mg / ml /	治療腸胃道痙攣及運動機能亢進	口乾、思睡、視力模糊

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
Butylbromide)	Amp		
Bisacodyl	Dulcolax 5mg Bisacodyl 10 mg / Supp	緩瀉劑	心跳不規則、肌肉痛、皮膚紅疹、異常疲倦
Baktar , Septrin , Sulfacotrim	Baktar 480 mg / Tab Septrin 480 mg / 5 ml / Amp Sulfacotrim 60 ml / BT	磺胺藥，是一種廣效性制菌劑	光敏感、腹瀉、頭暈、食慾缺乏、噁心或嘔吐、疲倦
Bacitracin-Neomycin Ointment	30 g / Tube	抗菌作用	食慾不振、噁心、下痢
Bevacizumab	Avastin Injection 100 mg / 4 ml / vial	抗癌藥物	無力、腹痛、高血壓、腹瀉、噁心、嘔吐、食慾不振、便秘、呼吸困難、剝落性皮膚炎
Bleomycin HCl	Bleocin 15 mg / Vial (1mg=1 unit)	抗癌藥物	肺炎樣、肺纖維化、發熱、出血、皮膚病變、口腔炎
Celecoxib	Celebrex 200 mg/Cap	非類固醇消炎止痛藥	背痛、末梢水腫、眩暈、頭痛、失眠、下痢、噁心、發疹
Codeine Phosphate	30 mg / Tab	麻醉性止痛劑及鎮咳劑。	嘔吐、噁心、暈眩、膽管痙攣、呼吸抑制
Colchicine	0.5 mg / Tab	降尿酸	骨髓抑制、周邊神經炎、掉髮、噁心、嘔吐、腹瀉及腹痛
Captopril	Capoten 25 mg / Tab	高血壓	咳嗽、口乾、皮膚疹或味覺障礙
Calcium Carbonate	Cal. Carbonate 500 mg / Tab (contains Ca 200 mg / Tab)	鈣質補充劑，也可緩解胃部不適或灼熱感	胃痛、噁心、嘔吐、打嗝、便秘、口乾、食慾不振
Calcium Gluconate	Calglon 10% 10 ml / Amp	鈣離子補充劑	高血鈣、抑鬱感、低血壓、心跳過慢、不整脈、暈厥
Cortisone Acetate	25mg / Tab	短效糖皮質固醇、抗	鹽分及水分滯留、出汗、增

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
		發炎及免疫抑制作用	加食慾
Cetirizine	Cetin 10 mg / Tab	抗組織胺製劑	昏昏欲睡、口乾、胃痛、噁心、頭痛、體重增加
Cyproheptadine HCl	Pilian 4 mg / Tab	抗組織胺製劑，可緩解各種過敏反應	鎮靜，口鼻喉嚨乾燥、眩暈
Castor oil	30 ml / BT	緩瀉劑	腹瀉、下痢、嘔吐
Cetuximab	Erbitux 100 mg / 50 ml / Vial	單株抗體	發燒、頭痛、瘡瘡樣紅疹、胃腸不適、噁心、嘔吐、疲倦
Carboplatin	Paraplatin 150 mg / 15 ml / Vial	抗癌藥物	骨髓抑制、嘔吐、週邊神經病變
Cisplatin	Platinex 50 mg / 100ml / BT	抗癌藥物	嘔吐、腎功能異常、週邊神經病變
Deferoxamine Mesylate	Desferal 0.5 g / Vial	排鐵劑	注射位置疼痛、皮膚潮紅、紅疹、低血壓、過敏性休克
Diclofenac	Cataflam 25 mg / Tab Voltaren SR 75 mg / Tab Voren - G Gel 40 g / Tube	NSAID 類抗發炎止痛劑，能抑制前列腺素的生合成	過敏、消化性胃潰瘍、胃腸出血、食慾不振、噁心、嘔吐、下痢、頭痛、嗜眠、暈眩
Digoxin	Lanoxin 0.25 mg / Tab	減輕心臟衰竭的臨床徵兆和症狀	厭食、噁心、嘔吐、心跳速率、傳導及節律等方面的障礙
Diltiazem	Herbesser 30 mg / Tab	高血壓、狹心症	暈眩、頭痛、末梢水腫、潮紅、發疹、牙齦增生、便秘、腹痛
Dobutamine	Gendobu 250 mg / 20 ml / Vial	升壓劑，加強心肌收縮力	噁心、嘔吐、心悸、心跳過速、呼吸困難
Dopamine	Uramin 200 mg / 5 ml / Amp	升壓劑，增加心室或上心室性期外收縮	胸痛、頭痛、嘔吐、低劑量可能導致血壓降低，外漏可能造成組織壞死
Dextran	Dextran 500 ml / BT	治療血液體積下降或是休克	發熱、關節痛、噁心、嘔吐、皮膚疹、發癢、胸悶、水腫

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
Dexamethasone	Decalon 0.5 mg / Tab、4 mg / Tab Dexaron Sodium Phosphate 4 mg / 2 ml / Amp	類固醇	水腫、月亮臉、水牛肩、內分泌失調、肝腎障礙
Diphenhydramine HCl	Diphenhydramini 30 ml / Amp	抗組織胺劑	嗜眠、眩暈、刺痛感、手鈍重和虛弱感、欣快感、發燒
Dextromethorphan	Detosiv Sustained Release Tablets 60 mg/Tab	鎮咳	便秘、頭痛、頭暈、嗜睡、噁心、嘔吐、胃痛
Domperidone	Emetrol 10 mg / Tab	抑制噁心、嘔吐、胃腸氣脹	口乾、男性乳脹、頭痛、皮膚癢、月經不規則
Doxorubicin Liposoma	Doxorubicin Liposomal Lipo - Dox 20 mg / 10 ml / Vial	抗癌藥物	骨髓抑制、口腔黏膜炎、胃腸障礙及手足產生紅腫觸覺痛感。第一次輸注時易引起急性反應，有潮紅、呼吸急促、低血壓等
Docetaxel	Taxotere 20 mg / 0.5 ml / Vial	有絲分裂微小管抑制劑	骨髓抑制、過敏反應、體液滯留、皮膚發疹、肌肉無力、關節疼痛等
Epoetin beta (Erythropoietin, EPO)	Recormon 2000 IU / Syringe Recormon 5000 IU / Syringe	刺激紅血球製造的純化醣蛋白	血壓上升、注射部位栓塞、骨頭疼痛及發冷等
Esomeprazole	Nexium 40 mg / Tab	阻斷胃酸的分泌	頭痛、腹痛、腹瀉、腹脹
Epinephrine	Adrenaline 1 mg/ml / Amp Bosmin Solution 0.1% 500 ml / BT	收縮末梢血管與毛細管，亢進心臟機能	心悸亢進、胸悶、不整脈、顏面潮紅、血壓異常上升、呼吸困難
Enoxaparin	Clexane 6000 Anti-Xa 60 mg / 0.6 ml / prefilled syringe	抗凝血作用	出血、血小板減少症、皮膚過敏反應、噁心、混亂
Entecavir	Baraclude 1 mg / Tab	抗 B 型肝炎病毒	腹瀉、消化不良、噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、疲勞、失

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
			眠、肝腫大或再發性肝炎
Epirubicin	Pharmorubicin 10 mg / Vial	抗癌藥物	骨髓抑制、口腔炎、噁心嘔吐、心臟毒性
Erlotinib	Tarceva 150 mg / Tab	抗癌藥物	腹瀉、皮膚紅疹、疲倦、噁心、嘔吐、食慾不振
Etoposide (VP-16)	Vepesid 50 mg / Cap Vepesid 100 mg / 5 ml / Vial	抗癌藥物	骨髓抑制、過敏反應、噁心嘔吐、食慾不振
Fentanyl	Durogesic 2.5 mg / Patch (25 mcg/hr) 、 5 mg / Patch (50mcg/hr)	麻醉性止痛劑。	呼吸抑制、窒息、肌肉僵硬、肌陣攣運動、心跳過慢、低血壓、噁心、嘔吐和暈眩
Fosinopril	Monopril 10 mg / Tab	抗高血壓	頭痛、暈眩、乾咳、低血壓、倦怠
Filgrastim (G-CSF)	300 mcg / 0.7ml / Amp	促進嗜中性白血球 增加	紅疹、噁心、嘔吐、骨痛、頭痛、發燒
Folic Acid	Folacin 5 mg / Tab	葉酸缺乏症	興奮、腹脹、皮膚疹
Fluconazole	Diflucan 50 mg / Cap Diflucan 100 mg / 50 ml / Vial	抗黴菌劑	頭痛、噁心、腹痛、腹瀉、紅疹
Framinomycin Sulphate	Framycin Gauze Dressing 18 mg 10x10 cm / Piece	局部外用皮膚及黏 膜的表皮感染	噁心、嘔吐、腹瀉、搔癢、皮膚炎
Glycerin Ball	Clyster 20 ml / Ball	緩瀉劑	
Goserelin	Zoladex Depot 3.6 g / Syringe	抗癌藥物	過敏、心搏過速、腸胃脹氣、關節痛、腹瀉、噁心、嘔吐
Gefitinib	Iressa 250 mg / Tab	抗癌藥物	腹瀉、噁心、嘔吐、紅疹、粉刺、皮膚乾燥、貧血、週邊水腫、無力
Gemcitabine	Gemzar 200 mg / Vial 健擇注射劑	抗癌藥物	骨髓抑制、噁心、嘔吐、尿蛋白、血尿、紅疹、搔癢、肝毒性
Haloperidol	Apo - Haloperidol 5 mg / Tab Halosten 1mg / Tab Binin - U 5 mg / ml / Amp	精神安定劑，止吐， 控制肌肉不自主抽 動	嗜睡，發抖、坐不穩、不自主運動、說話困難、口乾、便秘、排尿困難、光敏感、體溫調節能力降低

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
Heparin	Agglutex 25000 U / 5 ml / Vial	血栓性栓塞症及其預防，抗凝血	出血、疼痛、水腫、注射部位有類組織胺反應、過敏反應、氣喘、關節炎、骨質疏鬆
Interferon beta-1b	Solu - Cortef 100 mg / Vial	類固醇	肌肉無力、固醇類引起之肌病變、骨質疏鬆症、消化性潰瘍、皮膚脆弱變薄、眩暈、月經不規則、皮膚萎縮等
Hydroxyurea	Hydrea 500 mg / Cap	抗癌藥物	骨髓抑制
Imipramine	Tofranil 10 mg / Tab Tofranil 25 mg / Tab	可緩解抑鬱或不安。	口渴、頻脈、思睡、發汗、手指震顫
Isosorbide Dinitrate	Isobide 10 mg / Chewable Tab Angidil 10 mg / 10 ml / Amp	預防及治療心絞痛	臉部潮紅、胃腸不適、噁心、嘔吐、頭暈目眩、心跳加快、皮膚潮紅、流汗、視覺模糊、極度緊張、昏厥、不安等
Iron Dextran	Desman 2 ml / Amp	補充鐵質，提升血紅素質。	發癢或不快感
Ifosfamide	Holoxan 2 g / Vial	抗癌藥物	脫髮、精神混亂、幻聽、噁心、嘔吐、骨髓抑制、出血性膀胱炎
Klean- Prep Power	68.6 g / pack	緩瀉劑	腹脹、腹痛
Kentamin	Kentamin	因缺乏維生素 B1、B6、B12 所引起等病後的營養補充	
Ketorolac Tromethamine	Keto 30 mg / ml / Amp	非類固醇抗炎劑：消炎鎮痛藥	噁心、腸胃道出血、潰瘍、紫斑症、尿滯留、肝腎衰竭、搔癢
Leucovorin	50 mg / Vial Antrex 15 mg / Tab	1. 作為 Methotrexate 過量中毒治療劑 2. 加強 5Fu 的抗癌作用	噁心、嘔吐、頭痛、失眠、倦怠感
Lipofundin MCT / LCT	20% 100 ml/BT(有 多種濃度及容量)	提供卡路里和必需脂肪酸	呼吸困難、發紺、噁心嘔吐、潮紅

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
Levocetirizine	Xyzal 5 mg / Tab	抗組織胺	睏倦、頭痛、頭昏、嘴乾燥
Lansoprazole	Takepron 30 mg / Cap	胃藥	發疹、搔癢
Loperamide	Imolex 2 mg / Cap	止瀉劑	腹部不適、腹脹、便秘、噁心嘔吐
Lactulose	Lactul 500 ml / BT	刺激腸蠕動、促進排便	腹痛、噁心、下瀉
Lamivudine	Zeffix 100 mg / Tab	B 型肝炎處方藥	肌肉抽筋、發燒、頭痛、疲倦、憂鬱
Lidocaine	Lidocaine 2% 20 ml / VI Xylocaine Jelly 30 g / Tube	局部麻醉劑	低血壓、焦慮
Morphine	Morphine 10 mg / Tab Sustained - release 30 mg / Tab、 10 mg / ml / Amp	麻醉性止痛藥	噁心、便秘、搔癢、休克、呼吸抑制
Meloxicam	Mobic 15 mg / Tab	非類固醇抗發炎止痛劑，抗發炎、解熱、鎮痛	消化不良、噁心、嘔吐、便秘、腹痛、腹脹、腹瀉
Magnesium Sulfate	10% 20 ml / Amp	抗痙攣、補充電解質	臉潮紅、低血壓、心臟抑制、鎮靜、心智混亂、呼吸抑制
Mecobalamin (Vitamin B12 Substance)	Mecomin 500 mcg / Amp Methycobal 250 mcg / cap	末梢神經障礙、V12 缺乏引起之巨胚芽紅血球性貧血	注射部位疼痛、頭痛、發汗、發熱
Moriamin-SN	200 ml / BT	氨基酸製劑	發疹、過敏、噁心、嘔吐。胸部不快感、心悸亢進
Methylprednisolone	Solu - Medrol Sodium Succinate 500 mg / Vial	類固醇，抗炎和免疫抑制作用	失眠、皮膚變暗或變淺、胃口增加或降低、皮膚起紅疹、臉部手腳水腫、延遲傷口癒合
Medicon - A	Medicon - A	鎮咳、祛痰	發疹、噁心、嘔吐、食慾不振
Mucaine	Mucaine	胃潰瘍、十二指腸潰	皮膚疹、舌炎、搔癢症、血

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
		瘍、食道炎	管水腫
Mepenzolate Bromide	Trancolon 7.5 mg / Tab	腹瀉、腹痛、腹脹	頭痛、眩暈、噁心、嘔吐。
Magnesium Oxide	250 mg / Tab	制酸劑、緩解便秘	暈眩、頭昏眼花、心跳不規則
Metoclopramide	Primperan 5 mg / Tab Promeran 10 mg / 2ml / Amp	預防嘔吐、逆流性消化性食道炎	思睡、靜坐不能、腹瀉、疲倦。EPS：不自主的手腳或眼精顫動、肌肉痙攣
Mycomb	Otic Drops 5 ml / BT	抗黴菌抗生素，用於外耳道念珠菌感染。	
Megestrol Acetate	Megejohn 40 mg / Tab	癌症的緩和性治療；癌症惡病質	促進食慾而導致體重增加
Methotrexate (MTX)	Trexan 2.5 mg/Tab Emthexate PF 50 g/2 ml / Vial Emthexate PF 1 g/40 ml / Vial	抗癌藥物	胃潰瘍、白血球減少、噁心、腹痛、抑鬱、寒冷和發燒、暈眩、皮疹、對光敏感
Naloxone	0.4 mg/ml / Amp	改善麻醉性止痛劑之急性中毒	入睡困難、焦慮、腹痛、噁心、無力、關節肌疼痛
Normacol	7 g / Pack	膨脹性纖維素緩瀉劑	脹氣、腹脹
Nitroglycerin	Nitrostat 0.6 mg / Tab Millisrol 50 mg / 100 ml / Vial (0.5 mg/ml)	用於預防胸痛（心絞痛），擴張心臟的血管，以增加心臟的血液和氧氣	頭痛、發疹、眩暈、胃不舒服、感覺發熱、視覺模糊、口乾、胸痛、昏厥
Nystatin	Mycostatin 500,000 U / Tab	治療黴菌感染所造成的口腔黏膜發炎	
Nifedipine	Nifehexal 10mg / Cap Adalat OROS 30 mg / Tab,SR	心絞痛、高血壓	頭痛、潮紅、頭昏眼花、熱感、心搏加速、心悸、低血壓、非心因性局部周邊水腫
Octreotide	Sandostatin 100 cg / 1 ml / Amp	胃及食道靜脈曲張出血	注射部位刺痛或灼熱感、發紅、腫脹、噁心、嘔吐腹痛、胃腸脹氣、下痢
Omeprazole	Losec 40 mg / Vial	治療胃潰瘍	噁心、頭痛、腹瀉、便秘、

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
			脹氣
Oxybutynin Chloride	Ditropan 5 mg / Tab	膀胱平滑肌的抗痙攣作用。局部麻醉作用全身的止痛作用	失眠、口乾、便秘、流汗減少、臉部潮紅、眼乾、噁心、無力、嘔吐、頭暈
Ofloxacin	Tarivid Otic Sol'n 3 mg / ml 5 ml / BT	抗生素	肝功能指數異常、噁心嘔吐、胃腹部不適或疼痛、腹瀉、食慾不振、胸悶、口渴、便秘
Oxaliplatin	Eloxatin Oxalip 50 mg / 10 ml / Vial	新一代 platinum 類的抗癌藥	骨髓抑制、噁心、嘔吐、腹瀉、末梢神經異常、發燒
Phytonadione(Vitamin K1)	10 mg / 1ml / Amp	因 Vit K1 吸收障礙引起之低血中凝血酶原症	潮紅、腸胃不適、過敏
Potassium Chloride	Slow - K 600 mg / Tab Kacilen 15% 20 ml / Amp	治療低血鉀症	高血鉀
Pamidronate Disodium	Aredia 15 mg / 5 ml / vial	治療腫瘤引起的高血鈣症	低血鈣、發燒、噁心、嘔吐、淋巴球減少、注射處疼痛
Prednisolone	Preson 5 mg / Tab Lyo - Donison 25 mg / ml / Amp	類固醇藥物	體液和電解質失調、肌肉無力、骨質疏鬆、胃潰瘍、脹氣、潰瘍性食道炎、延遲傷口癒合、低血壓或高血壓
Pecolin Suspension	Kaopectin 120 ml / BT	暫時緩解輕微或中度急性腹瀉	便秘
Paclitaxel	Taxol 30 mg / 5 ml / Vial	抗癌藥物	骨髓抑制、過敏、低血壓、周邊神經病變、肌肉痛或關節痛、噁心嘔吐、禿髮、肝功能異常
Pemetrexed	Alimta 500 mg / Vail	抗癌藥物	骨髓抑制、厭食、GOT/GPT 升高、噁心、疲勞、皮膚刺激。
Pemetrexed	Alimta 500 mg / Vail	抗癌藥物	骨髓抑制、厭食、GOT/GPT 升高、疲勞、噁心、皮膚刺激。
Rabeprazole	Pariet F. C. 20 mg / Tab	胃潰瘍	蕁麻疹 GOT、GPT、上升、便秘、頭痛
Ranitidine	Zantac	可減少胃液及胃酸	可逆性肝炎、蕁麻疹、發燒、

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
	150 mg / Tab Zantac 50 mg / 2ml / Amp	分泌	支氣管痙攣、低血壓、過敏性休克、頭痛及眩暈現象
Rituximab	Mabthera 100 mg / 10 ml / Vial 500mg / 50 ml / Vial	人類單株抗體，	發燒、寒顫、血管水腫、噁心、蕁麻疹、頭痛、呼吸困難、咽喉刺激、鼻炎和腫瘤疼痛
Sodium Bicarbonate	Bicarbona 7% 20 ml / Amp	改善代謝性酸血症之臨床現象	鹼中毒、強直性痙攣時。口唇麻木感、知覺異常現象、脈搏減慢現象。
Sennosides	Kayexalate Resonium - A Powder 453.6 g / BT	治療高血鉀症	血鉀過低
Secorine	120 ml / BT	緩解感冒的症狀，流鼻水，咳嗽	
Sennosides	Through 20 mg / Tab	緩瀉劑	腹絞痛、脹氣、噁心、水瀉、水及電解質過度損失
Silymarin	Kascoal 40 mg / Tab	消除脹氣	軟便、胃部不適、腹瀉、腹痛、嘔吐、頭痛
Silymarin	150 mg / cap	能保護肝臟，使損傷之肝臟組織復元	噁心、腹瀉、腹部不適
Silver Sulfadiazine	Silverzine Cream 1% 20 g / Tube Canflame Cream 1% 450 g / Can	燙傷藥膏，預防及治療二度或三度燙傷引起的感染	擦拭部位有燒灼感、疼痛、搔癢、出疹情形
Tramadol	Tramal Retard 100 mg / Tab	麻醉類止痛劑	發汗、眩暈、嘔吐、口乾與疲勞
Tamsulosin	Tamlosin 0.2 mg / Cap	改善尿道血流和減低良性前列腺肥大	全身無力、頭痛、眩暈、失眠、姿位性低血壓、下痢、噁心、鼻炎
Tranexamic	Trand 250 mg / Cap Transamin 250 mg / 5 ml / Amp	治療全身及局部出血或出血性疾病	偶而引起輕度胃腸障礙，如：噁心、嘔吐
Topaal	Topaal	制酸劑	腹脹、打嗝、腹瀉、偶有噁心嘔吐

藥品	劑量、劑型	作用	副作用
Thalidomide	Thado 50 mg / Cap 賽得膠囊	抗癌藥物	致畸胎、嗜睡、皮疹、便秘、末梢神經感覺病變等
Triamcinolone	Nincort oral gel 0.1% 5 g / Tube	類固醇藥物，用於口腔潰瘍	
Trastuzumab	Herceptin 440 mg / Vial	單株抗體	發燒、冷顫
Urokinase	60000 IU / Vial	可將纖維蛋白的血塊分解	出血
Vitamin B Complex	Vitalex Tab Combeplex 1ml / Amp	營養補給、壞死病及齒齦出血	
Vinorelbine Tartrate	Navelbine 10 mg/1 ml / Vial Navelbine 30 mg / Cap	抗癌藥物	顆粒性白血球過少症、皮膚感覺異常、便秘、噁心嘔吐等
Warfarin Sodium	Coumadin 5 mg / Tab	抗凝血作用	出血
Zoledronic Acid	Zometa Powder for Infusion 4 mg / Vial	抑制蝕骨細胞活性，治療因惡性腫瘤引起的高血鈣	發熱、疲倦、呼吸困難、肌肉痛、貧血、嘔心、嘔吐、便秘
Zinc Oxide	Ointment 250 mg / Tube	具有局部收斂、保護和防腐作用，塗敷在傷口或潰瘍處，具有保持乾燥和抑制分泌的效果	

蒸氣吸入藥物

藥品	劑量	作用	副作用
COMBIVENT(吸入-橘)	2.5mL/Amp (複方)		

氣喘藥物

藥品(學名)	劑量	圖片
短效乙二型刺激劑 (SABA)		
備勞喘 Berotec (Fenoterol)	100 µg/劑	
泛得林 Ventolin (Salbutamol)	100 µg/劑	
短效乙二型刺激劑 (SABA) +短效抗膽鹼藥物(SAMA)		
備喘全 Berodual (Fenoterol+ Ipratropium)	50 / 20 µg / 劑	
超長效乙二型刺激劑(Ultra-LABA)		

適維樂 Striverdi (Olodaterol)	2.5 μg / 劑	
長效抗膽鹼藥物(LAMA)		
英克賜 Incruse (Umeclidinium)	55 mcg / 劑	
適喘樂 Spiriva (Tiotropium)	2.5 μg / 劑	
固定合併吸入型類固醇與長效乙二型刺激劑(ICS+LABA)		
使肺泰 Seretide (Fluticasone propionate + Salmeterol) 使肺泰準納吸入器 (胖胖魚吸入器)	100/50; 250/50; 500/50 μg / 劑	
吸必擴 Symbicort (Budesonide + Formoterol)	160/4.5 μg / 劑	

Seretide Evohaler MD I (Fluticasone propionate + Salmeterol) 中文名：使肺泰定量吸入器	50/25, 125/25, 250/25 μ g / 劑	
Relvar Ellipta (Fluticasone furoate + Vilanterol): 潤娃易利達乾粉吸入器	92/22 μ g / 劑	
商品名：Symbicort Turbuhaler 學名：Budesonide + Formoterol 中文名：吸必擴都保吸入器	160/4.5 μ g / 劑	
雙長效合併支氣管擴張劑 (Fixed dual LABA+LAMA)		
安肺樂 Anoro (Vilanterol + Umeclidinium)	55/22 μ g / 劑	
適倍樂 Spiolto (Olodaterol + Tiotropium)	2.5/2.5 μ g / 劑	

吸入型類固醇(ICS)		
保衛康 Alvesco (Ciclesonide)	160 μ g /劑	
帝舒滿 Duasma (Budesonide)	200 μ g /劑	
輔舒酮 Flixotide (Fluticasone propionate)	50 μ g /劑	
可減喘 Pulmicort (Budesonide)	200 μ g / 劑	

常見檢查

一、 胸腔內科

檢查中文名稱	檢查英文名稱
核子骨骼掃描	Bone scan
支氣管鏡檢	Bronchoscopy
胸部斷層定位切片	CT-guided biopsy
胸部超音波	Chest ultrasound
胸部 X 光	CXR
電腦斷層攝影	CT (Computer tomography)
腹部 X 光	KUB (Kidney, Ureter, Bladder)

核磁共振攝影	MRI (Magnetic Resonance Imaging)
肺功能檢查	Pulmonary function tests
胸腔穿刺術	Thoracentesis

呼吸音評估

呼 吸 音	可 能 機 轉	特 性	常 見 原 因
Wheezes 哮鳴	氣流快速通過變狹窄的極小支氣管	連續高音似吹口哨音頻 >400Hz 常見於吐氣期	氣喘、肺水腫、心衰竭、支氣管炎
Stridor 喘鳴	氣流快速通過變狹窄的上呼吸道	連續高音、很大聲不用聽診器也可聽到	上呼吸道狹窄、拔管後、哮吼、會厭炎
Rhonchus 乾囉音 (coarse crackles)	氣流通過被分泌物阻塞的較大支氣管	連續低音似打鼾音頻<200 Hz 吸氣和吐氣	嚴重肺炎、支氣管炎
Rales 濕囉音 (fine crackles)	周邊閉鎖的呼吸道突然打開	不連續的細囉音似捻髮音 吸氣末期	肺塌陷、纖維化，肺水腫
Friction Rub 胸膜摩擦音	兩層肋膜間出現阻力 隨著呼吸而彼此摩擦	高音、粗、刺耳吸氣末、 吐氣初	肋膜發炎、變厚、長癌

常見的護理問題

1. 潛在危險性跌倒
2. 體溫過高
3. 低效性呼吸型態
4. 呼吸道清除功能失效
5. 氣體交換障礙
6. 疼痛
7. 睡眠型態紊亂
8. 皮膚完整性受損、潛在危險性皮膚完整性受損
9. 活動無耐力
10. 身體活動功能障礙
11. 組織灌流改變-心肺
12. 組織灌流改變-腸胃
13. 組織灌流改變-腦、組織灌流改變-腎
14. 體液容積過量/不足
15. 知識不足
16. 營養狀況改變-少於身體需求
17. 排便型態改變-腹瀉
18. 排便型態改變-便秘
19. 自我照顧能力缺失：進食、沐浴及衛生、如廁、穿衣及修飾
20. 組織灌流改變/與食道靜脈曲張破裂、所引起的大出血有關
21. 低效性呼吸型態/與腹水積聚，導致肺臟無法完全擴張有關
22. 體液容積過量/與腹水、水腫有關
23. 潛在危險性傷害：出血/與凝血因子製造不足有關
24. 潛在危險性傷害：跌倒/與年齡>65 歲或身體虛弱有關
25. 潛在危險性傷害：肝昏迷/與血中氨值過高或腸胃道出血所引起的肝昏迷有關

實習前測驗題方向

1. 單導/存留導尿管技術？
2. 靜脈輸液計算？併發症的原因及處置？
3. 輸血的反應有哪些？輸血前應輸何種容液？
4. 昏迷指數包括哪些項目？滿分是多少？
5. 盤尼西林皮膚試驗/抽痰技術

貳、實習住宿場所

一、住宿地點介紹：

地點：台南市安南區北安路四段 548 巷 94 號（以學校實習規範規定 18:30 宿舍集合，早到者請在外面自行等待）

二、住宿注意事項：

1. 請隨時保持宿舍內清潔整齊，不得張貼任何海報、毀損家具或塗擦牆壁，老師不訂定期抽查，損毀者請自行負責。
2. **垃圾分類需確實執行**，將鐵罐、鋁罐、易開罐、玻璃瓶、寶特瓶、鋁箔包、紙盒包、養樂多罐等依照指示歸類丟棄，**並定期排值日生將垃圾拿至一樓丟棄**，以防止滋生蚊蟲。
3. 每室需選出室長一人負責寢室清潔、聯絡等各事項，並輪流安排室友清掃寢室。
4. 愛護宿舍內之設備及公物，用完請歸位。
5. 衣物請集中脫水以節約能源，並請愛惜使用脫水機。
6. 宿舍內請勿喧嘩，關門請輕聲，走路請端莊，不可跑步。
7. 維護校譽，請注意言行舉止及禮貌，留給他人好印象。
8. 離開宿舍時，務必服裝整齊以示莊重。
9. 上班以外時間，不在實習場地，不宜穿著校服或實習服。
10. 為維護宿舍安全，請勿帶親戚朋友進入宿舍區，違反者一律依校規處分。
11. **“每週日至週四” 7PM-9PM 為晚自修時間。**
12. 每個單位之小組長負責該單位之晚點名，臨床指導老師負責抽查之，**若有缺席而袒護不記者與缺席同學等，加重處分。**
13. 晚自修 7PM-9PM 只能看醫學書及寫作業，除上廁所外不可任意離開書桌隨意逗留走動。
14. 晚自修不可聽音樂，就寢時間請使用耳機，將音樂放出來者一律沒收隨身聽或收音機。
15. 7PM-9PM 及就寢時間 10PM 後不可接聽任何電話且手機一律關機，若被查到晚自習或就寢時間後接聽手機者，一律予以沒收。
16. 晚自修點名未到者，一律以校規處分。
17. 11PM 一律準時關大燈睡覺，切勿交談及看書；10PM 前請將刷牙、洗臉完成。
18. 組長或代理人負責查鋪，若缺席不按實情登記與缺席同學等，加重處分。
19. 同寢室同學有違反規定而未向組長、臨床指導老師報告檢舉者，全寢同學均記小過乙次。
20. 就寢時間後一律不准外出，未遵守規定者：記大過一次以上或留校察看（警衛室有 24 小時錄影機，請同學們不要以身試法）。
21. 最後離開寢室者請隨手關電風扇、關燈、鎖門。
22. 歸省證請同學填好時間、日期，於休假前一天收齊交給老師，休假後一天也請收齊銷假，未辦歸省、無家長印鑑、未按時銷者依規定處分，假日之收假時間為 6：30（PM），請同學需準時返回宿舍，未準時收假者，則依**遲到**論。
23. 至親友家住請先經過老師准許，並填寫好你的大名、對方姓名、與你之關係、電話、住址。
24. 隨時保持安靜，不得過份喧嘩，**若被住戶反應太吵者一律依校規處分。**

25. 緊急聯絡：王靖潔老師-0910871869
26. 自備無線網卡、薄床墊、自黏棒、延長線、吹風機、換洗衣物、垃圾袋、抹布、室內拖、洗衣精、環保餐筷、網卡、口罩、1 吋照片。
27. 宿舍內一概不使用烹調食物之電器用品，使用者依校規處置。
28. 請熟讀學校制定的實習規範。
27. 基護課本、三色原子筆、筆記本、橡皮擦、直尺、鉛筆、瞳孔筆(測量瞳孔大小之用)
28. 請完成常見診斷、檢查之中文查閱(會檢查並抽問)
29. 禁止接受不當餽贈，禁止私下會客，禁止上班實習期間隨身攜帶手機，禁止閱讀或從事於實習無關的刊物或活動。
30. 緊急聯絡：王靖潔老師 091087186